



Cyanea capillata (Rød brennmanet)



Foto: Erling Svensen



Foto: Erling Svensen



Foto: Erling Svensen

Beskrivelse

Hører til skivemanetene (Orden Semaostomeae). Rød brennmanet er en av de største manetartene som finnes. Fargen varierer fra lys oransje til mørk rød-brun. Den har mange og lange brenntråder som kan bli opptil 30 meter lange.

Størrelse


50 cm – 2 m i diameter.

Levesett

Rød brennmanet er et rovdyr. Den driver med strømmen men har svømmebevegelser som gjør at de kan regulere dyppet de befinner seg på.

Giftighet

Rød brennmanet tilhører nesledyrene. Nesledyrene har neslegift som de bruker til å lamme og drepe byttedyr eller beskytte seg mot fiender. Rød brennmanet svir kraftig hvis man får den på huden, og neslegiften kan skade fiskens gjeller, hud og øyne. Neslecellene sitter på brenntrådene og disse kan forårsake skade også når de er revet av dyret. Forårsaket dødelighet hos oppdrettsfisk i Norge.



Data hentet fra artsdatabanken og viser registreringer av arten.

Utbredelse i Norge

Rød brennmanet er den vanligste brennmaneten i våre farvann og forekommer langs hele kysten og i fjordene. Høyest forekomster om sommeren.